

Avant la vaccination

Problème physique, psychique ou cognitif :

- Chimiothérapie
- Anxiété, stress
- Lymphœdème...



OUI

Médecin traitant



Eligibilité du patient

OUI

Vérification des contre-indications

NON

Information des potentiels effets indésirables

Recueil du consentement du patient : *Formulaire*

OUI

Préparation à l'injection

L'injection

- Position assise de la personne
- Repérage de la zone d'injection
- Désinfection avec temps de contact et séchage du produit adapté

Personne sous anticoagulants

NON

Injection IM

Après l'injection

Surveillance du patient

Conseils au patient

Traçabilité

Tarifcation du vaccin et de l'injection

Majeur avec bon Assurance Maladie

Majeur sans bon Assurance Maladie répondant aux critères :

- Femme enceinte
- Personne à IMC > 40
- Entourage de bébé < 6 mois à facteurs de risque de grippe grave et de personnes immunodéprimées (FAQ Annexe1)

Pas de vaccination en officine

- Allergie protéines de l'œuf et du poulet
- Réaction à une précédente vaccination
- Hypersensibilité à néomycine, gentamycine, formaldéhyde

OUI

Médecin traitant

Fièvre, maladie aiguë

OUI

Reporter la vaccination

- Douleur, gonflement, induration au point d'injection
- Céphalées, myalgies
- Fièvre, malaise, frissons
- Effets rares : choc allergique, rash, érythème

NON

Pas de vaccination en officine

- Gants (non obligatoire mais recommandé)
- Compresses stériles + antiseptique
- Pansement
- Boîte de recueil DASRI
- Trousse de secours
- Vaccin à température ambiante
- Lavage des mains



- Absence de problème cutané au point d'injection : cicatrice, inflammation, démangeaisons, douleur...
- Personne avec tatouage : ne pas piquer dans l'encre
- Personne avec curage axillaire : vacciner côté opposé

OUI

Injection SC

- Recueil de la goutte de sang avec la compresse
- Application du pansement
- Pas de recapuchonnage de l'aiguille
- Elimination des déchets dans la boîte DASRI

- Absence de réaction
- Survenue d'un malaise vagal ou choc anaphylactique : conduite à tenir spécifique
- Autres problèmes → Consultation médicale



- Réactions locales type œdème, rougeur, induration → application de froid et prise d'un antalgique simple (paracétamol sauf contre-indication)
- Extension rapide ou douleur importante → orientation vers consultation médicale



- Inscription sur DMP ou carnet de vaccination ou remise attestation (FAQ Annexe 5)
- Enregistrement sur un registre à la pharmacie (FAQ Annexe 4)
- Transmission au médecin traitant par messagerie sécurisée