

QUE FAIRE EN CAS D'HYPOGLYCÉMIE CHEZ UN RÉSIDENT SOUS INSULINE ?

Signes d'alerte de l'hypoglycémie

Sueurs, Pâleur, Sensation de faiblesse, Vertige, Vision trouble,
Maux de tête, Irritabilité, Tremblements, Troubles de la conscience,
Troubles du langage d'apparition rapide, Palpitations



Glycémie < 0,80 g/l

Conduite à tenir

- ① Resucrage avec des sucres rapides :

3 morceaux de sucre ou 1 brique de jus de fruit

➡ Vérifier la **glycémie 30 min après** le resucrage

- ② Selon l'horaire de l'hypoglycémie

➡ **Au moment du repas** : resucrer d'abord puis dès amélioration des signes, donner le **repas** en faisant l'injection d'**insuline à la dose prévue** pour ce repas.

➡ **En dehors du repas** :

- Si **1h avant le repas** : **avancer l'heure** du repas
- Si **plusieurs heures avant le repas**, donner une **collation** avec des **sucres lents** : 2 petits beurrés ou 30g de pain ou 1 madeleine

Si voie orale impossible et/ou patient inconscient et nécessitant l'intervention d'un tiers pour le resucrage

➡ **Appeler un médecin ou le 15**

➡ Selon l'avis médical, administrer **GLUCAGEN® IM** ou **BAQSIMI®** (glucagon intra-nasal)