

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INSULINES DISPONIBLES EN FRANCE

Type d'insulines	Molécules actives / Spécialités	Caractéristiques de l'insuline	Modalités de prise A adapter selon la prescription	Surveillance glycémique
Action ultra-rapide 	<i>Insuline lispro</i> LYUMJEV® <i>Insuline asparte</i> FIASP®	Délai : 2-5 min Durée : 3h	Injection 0 à 5 min avant repas Ne pas donner si pas de repas	Glycémie préprandiale juste avant l'administration et Glycémie 2h postprandiale
	<i>Insuline lispro</i> HUMALOG® <i>Insuline asparte</i> NOVORAPID® INSULINE ASPARTE SANOFI® <i>Insuline glulisine</i> APIDRA®	Délai : 5-10 min Durée : 3-4h	Injection 15 min avant repas Ne pas donner si pas de repas	
Action rapide 	<i>Insuline humaine</i> ACTRAPID® UMULINE® RAPIDE	Délai : 20-30 min Durée : 4-6h	Injection 20-30 min avant le repas Ne pas donner si pas de repas	Au minimum 3 glycémies/j : matin, midi et soir avant les repas
Action intermédiaire 	<i>Insuline humaine</i> INSULATARD® UMULINE® NPH	Délai : 1h Durée : 10-12h	Injection indépendante des repas	
Action lente 	<i>Insuline glargine</i> LANTUS® ABASAGLAR® TOUJEO® <i>Insuline detemir</i> LEVEMIR® <i>Insuline degludec</i> TRESIBA®	Délai : 1h30 Durée : 14-42h	Injection indépendante des repas mais à faire tous les jours à la même heure (matin ou soir)	Au minimum 1 glycémie/j le matin à jeun

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INSULINES DISPONIBLES EN FRANCE

Type d'insulines	Molécules actives / Spécialités	Caractéristiques de l'insuline	Modalités de prise A adapter selon la prescription	Surveillance glycémique
Action mixte : ultra-rapide + intermédiaire 	<i>Insuline lispro [25 ou 50% d'action rapide]</i> HUMALOG® MIX 25 ou 50 <i>Insuline asparte [30 ou 50% d'action rapide]</i> NOVOMIX®30 ou 50	Délai : 5 min Durée : 10-12h	Injection lors du repas, avis médical si pas de repas* * cf. avec médecin référent	Au minimum 3 glycémies/j : matin, midi et soir
Action mixte : rapide + intermédiaire 	<i>Insuline humaine [30% d'action rapide]</i> MIXTARD®30 UMULINE PROFIL® 30	Délai : 20 min Durée : 10-12h	Injection 20-30 min avant le repas, avis médical si pas de repas* *cf. avec médecin référent	
Association d'insuline lente et d'analogue de GLP1 	<i>Insuline degludec + liraglutide</i> XULTOPHY®	Délai : 1h30 Durée : jusqu'à 42h	Injection indépendante des repas mais à faire tous les jours à la même heure	Au minimum 1 glycémie/j le matin à jeun



Autres traitements du diabète à ne pas confondre avec les insulines

- ➡ prise indépendante des repas
- ➡ pas de nécessité d'une surveillance glycémique avant ou après administration.

Analogues de GLP1

<i>Dulaglutide</i> Trulicity® : stylo monodose <i>Sémaglutide</i> Ozempic® : stylo multidoses	1 injection/ semaine
<i>Liraglutide</i> Victoza® : stylo multidoses	1 injection/jour

Agoniste des récepteurs du GIP et du GLP1

<i>Tirzépatide</i> Mounjaro® : stylo multidoses	1 injection/ semaine
--	-----------------------------