


DONNEES NATIONALES D'ADDICTOVIGILANCE

Les données d'addictovigilance montrent une augmentation importante du nombre de cas d'abus/dépendance mais aussi de fraudes avec ces molécules : gabapentine et prégabaline.



ENQUÊTE RÉALISÉE EN GRAND EST ET BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : 127 MÉDECINS GÉNÉRALISTES PARTICIPANTS

- 20 à 25 % des médecins pensent que les gabapentinoïdes ont l'indication pour la fibromyalgie et environ 25 % les prescrivent pour cette pathologie
- Seule la moitié des médecins avaient connaissance des risques de dépression respiratoire si association aux opioïdes



Pour en savoir plus



MESSAGES CLES

POTENTIEL D'ABUS ET DE DÉPENDANCE DES GABAPENTINOÏDES : ^{(1) (2)}

- 12 % des sujets initiant la prégabaline en contexte thérapeutique présentent un mésusage notamment par l'utilisation de doses supérieures aux doses maximales thérapeutiques
- La majorité des patients ont des antécédents d'abus à d'autres substances
- L'obtention illégale concerne une majorité des cas d'addictovigilance (falsification ordonnance, nomadisme, achat de rue)

SYNDROME DE SEVRAGE À L'ARRÊT OU À LA DIMINUTION DE LA POSOLOGIE :

anxiété, sueur, craving, dépression, idée suicidaire

SIGNES DE SURDOSAGE AIGU :

troubles de la conscience, désorientation, confusion, coma (majorité en association avec autres substances)