



PROPHYLAXIE PAR ANTICORPS MONOCLONAUX ÉLIGIBILITE ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

ÉLIGIBILITÉ A LA PROPHYLAXIE PAR ANTICORPS MONOCLONAUX




Tous les patients précités sont éligibles à la prophylaxie par bithérapie d'anticorps monoclonaux Casirivimab – Imdevimab (Ronapreve®)


TEST



TRAITEMENT PAR ANTICORPS MONOCLONAUX



- Administration simultanée des deux anticorps par **perfusion intraveineuse d'une durée de 20 à 70 minutes** ou en cas d'impossibilité par **injection sous cutanée**, par un professionnel de santé qualifié dans un établissement de santé.



*Liste des situations à **très haut risque** de forme sévère de COVID-19 :

- Receveurs de greffes d'organes solides,
- Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
- Hémopathie lymphoïde (leucémies lymphoïdes chroniques traitées ou non, lymphomes non-hodgkiniens, myélomes sous traitement, y compris receveurs de CAR-T cells)
- Traitement par anticorps anti-CD20 ou
- inhibiteurs de BTK (Bruton tyrosine kinase) ou azathioprine, cyclophosphamide et mycophénolate mofétil
- Déficit immunitaire primitif

Situations à **haut risque de complication de COVID-19 :

Se référer au RCP et au PUI-RD disponibles sur <https://ansm.sante.fr/> ou has.fr