


Titration de la spécialité Recivit® :

"Identifier une dose d'entretien optimale pour le traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP). Cette dose optimale doit permettre une analgésie adéquate avec un taux acceptable d'effets indésirables".



Si la dose unique de 533 µg n'était pas satisfaisante, au prochain ADP :

Prendre 800 µg

Puis attendre 15 à 30 minutes après l'administration du comprimé

Dose efficace obtenue
-->
À utiliser pour ADP ultérieur

OUI

Est-ce que le soulagement de la douleur est satisfaisant ?

NON

Ne pas reprendre une dose supplémentaire
-->
Examiner d'autres alternatives thérapeutiques

ATTENTION :

- Lors de la phase de titration, l'accès douloureux paroxystique ne peut être traité par plus de deux prises de Recivit[®].
- Un **délai d'au moins 4 heures** doit être respecté pour traiter le prochain accès douloureux paroxystique avec Recivit[®].

Lorsque la dose efficace est obtenue avec un taux acceptable d'effets indésirables, on utilisera cette dose pour les ADP ultérieurs c'est ce que l'on appelle le traitement d'entretien :

- On limite le traitement de 4 ADP maximum par jour, soit quatre doses de Recivit[®] maximum.
- Si on dénombre de plus de 4 ADP par jour et pendant plus de 4 jours consécutifs, le traitement de fond morphinique doit être réévalué (posologie ou changement de spécialité).
- En cas de modification du traitement de fond morphinique, la dose de Recivit[®] doit être réévaluée et réadaptée.